



Kiaunė

2015



Išvaizda



Nuotraukos autorius Renatas Jakaitis
(www.naturephoto.lt) (Miškinė kiaunė)




Nuotraukos autorė Lina Marmaitė
(www.naturephoto.lt) (Akmeninė kiaunė)



Pēdsakai



A



B



A



B

- A. Akmeninė kiaunė
- B. Miškinė kiaunė



Pėdsakai



Miškinė kiaunė:

vasara:

ilgis: 4,0 – 5,2 cm

plotis: 3 – 3,5 cm

žiema:

ilgis: 8,0 – 9 cm

plotis: 4 – 5 cm



Akmeninė kiaunė:

ilgis: 5,5 – 6,0 cm

plotis: 3,5 – 4,0 cm



Pėdsakai



1 - 2 pav. Akmeninės kiaunės pėdsakai žiemos metu mažai apaugę plaukais, tad ant puraus, drėgno sniego matyti ryškios pirštų, pado trynių žymės.




Pėdsakai




3 pav. Perbėgdamos iš vienos vietos į kitą - šuoliuoja.
Šuoliukų ilgis siekia apie 60 – 70 cm, bėgant lėčiau 40 – 50 cm.



Veiklos žymės



- 96 – juodasis šeškas
- 86 – miškinė kiaunė
- 90 – Šermuonėlis
- 89 – žebenkštis





Veiklos žymės



4 - 5 pav. Miškinių kiaunių išmatos aptinkamos atokiau nuo gyvenviečių. Jos būna ant įvairių pakilimų, nuvirtusių medžių.



Veiklos žymės



6 - 7 pav. Miškinės kiaunės minta tiek gyvulinės, tiek augalinės kilmės maistu.



Veiklos žymės



8 - 10 pav. Vasaros laiku miškinių kiaunių racione nemažą dalį sudaro miško uogos. Suvalgytų uogų sėklos gerai matosi išmatose.



Veiklos žymės



11 - 12 pav. Miškinės kiaunės kartais įsikuria genių
iškaltauose uoksuose. Lipdamos palieka nagų žymes.




Veiklos žymės



13 - 15 pav. Akmeninės kiaunės išmatos didesnės nei miškinės kiaunės. Turi nemaloniai aštrų kvapą.



Laikinos slēptuvēs





Mityba

- Miškinė kiaunė minta paukščiais, įvairiais graužikais, uogomis, vaisiais, riešutais, vabzdžiais, kiaušiniiais;
- Kartais pasigauna tetervinų, genių, voverių, žuvų.
- Miškinė kiaunė yra smaližė, tad pasitaikius progai stengiasi pasivaišinti bičių medumi;
- Linkusi kaupti maisto atsargas;
- Per parą gali suvalgyti apie 130 – 150 g maisto.





Šeimos struktūra ir gyvensena

Akmeninė kiaunė

- Įsikuria gyvenvietėse, nemiškingose vietovėse, apleistuose pastatuose, miške, akmenų krūsnyse, malkų krūvose;
- Poruojasi liepos mėn.;
- Nėštumas trunka 294 dienas;
- Atsiveda nuo 2 iki 7 jauniklių;

Miškinė kiaunė

- Gyvena mišriuose, lapuočių miškuose;
- Įsikuria drėvėse, voverių, plėšriųjų paukščių lizduose, inkiluose;
- Poruojasi liepos mėn.;
- Nėštumas trunka 264 - 282 dienas;
- Atsiveda nuo 3 iki 5 jauniklių;